

Matthew T. Brigger, MD, MPH

Division Chief

Morgan Bliss M.D.

Daniela S. Carvalho, MD

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP

Javan Nation, M.D.

Seth M. Pransky, MD, FAAP

Fellow:

Alex Mantheghi, MD

Physician Assistant:

Denise M. Lago, PA-C

Main Office:

3030 Children's Way

Suite 112

San Diego, CA 92123

(858) 309-7701

(858) 966-8038 Fax

Regional Offices:

Encinitas

(760) 944-5545

Escondido

(760) 755-7600

Murrieta

(951) 600-1640

Oceanside

(760)547-1020

Cuidado para la Timpanoplastia Post-Operatorio

1. Limitaciones en las actividades:

1. Mantener seco el oído operado (especialmente evite nadar)
2. No sonarse la nariz
3. Reducir las actividades físicas
 - Restricciones en educación física: Ninguna _____ días
 - No ir a la escuela por _____ días

2. Cuidado de la herida:

1. Si tiene una gasa puede quitarla al día siguiente de la cirugía.
2. Algodón en el oído - Cambie el algodón de 2-3 veces a día. Excepto si el algodón muestra supuración de sangre por varios días. No es necesario de colocar el algodón cuando el oído deje de supurar

3. Medicamentos:

1. Antibióticos - _____
2. Medicamentos para el dolor
 - Por lo general Tylenol o Ibuprofeno es lo único que se necesita.
 - Se puede recetar un medicamento más fuerte para el dolor como es Norco o Hycet.
3. Gotas para los oídos

_____, _____ por _____
gotas #de gotas veces al día días

Empezar _____

4. Nutrición - Regular

5. Visita de seguimiento _____

6. Comuníquese a nuestra oficina si el paciente tiene temperatura mayor de 103°, sangrado excesivo, dolor fuerte, hinchazón o enrojecimiento detrás del oído.