

Matthew Brigger, MD,MPH

Division Chief

Morgan Bliss, MD

Daniela S. Carvalho, MD

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP

Javan Nation, MD

Seth M. Pransky, MD, FAAP

Fellow:

Alex Manteghi, MD

Physician Assistant:

Denise M. Lago, PA-C

Main Office:

3030 Children's Way

Suite 112

San Diego, CA 92123

(858) 309-7701

(858) 966-8038 Fax

Regional Offices:

Encinitas

(760) 944-5545

Escondido

(760) 755-7600

Murrieta

(951) 600-1640

Oceanside

(760)547-1020

www.RCSSD.org

Revised 07/01/15

Cuidados Postoperatorios para la Cirugía de Tubos De Timpanostomía

A su hijo(a) se le insertaron en el tímpano, unos tubitos de plástico de ventilación. Estos tubos permanecerán en su lugar por aproximadamente 6 a 12 meses y serán extraídos por el oído espontáneamente. Revisaremos el oído cada 4 a 6 meses en nuestra clínica, hasta que el tubo se salga del tímpano y quede en el canal auditivo externo. En ese momento, el tubo será extraído fácilmente del canal auditivo.

Instrucciones Postoperatorias:

- **Gotas Oticas:** Inmediatamente después de la cirugía, se le dará instrucciones para usar las gotas. Favor de seguir como se detalla a continuación:

Administre: _____

Gotas	Veces por Día	Número de Días
<input type="checkbox"/> Oído Izquierdo	<input type="checkbox"/> Oído Derecho	<input type="checkbox"/> Ambos

Secreciones del Oído:

- Mientras los tubos están en los oídos, una infección se podrá presentar. Las secreciones del oído generalmente significan que hay una infección. La secreción puede presentarse en líquido turbio, mucoso, con costra y hasta con sangre (no como la cerilla del oído que es amarilla o café) Esto usualmente puede ser tratado con antibiótico a base de gotas oticas en lugar de antibióticos tomado oralmente.
- Si el oído empieza a drenar, favor de usar las gotas oticas recetadas:
- 5 gotas, 2 veces al día por 5 a 7 días; o como fueron indicadas por su médico.
- Si el drenaje continua después de haber usado las gotas, favor de llamar a su doctor de cuidados primarios o a nuestra enfermera al 858-309-7706 para cuidado más a fondo.

Precaucion con el agua: Anteriormente se les recomendaba que a los niños con tubitos, evitaran el agua al bañarse o al nadar. Este abordaje ha cambiado y el uso rutinario de tener precauciones con el agua ya no es necesario en la mayoría de los casos. El medico lo discutirá con ustedes cuando sea necesario usar precaución.

Dolor Post operatorio: Aunque generalmente no es un procedimiento doloroso, Acetaminophen (Tylenol,Panadol) o Ibuprofeno (Motrin,Advil) puede ser tomado si hay alguna molestia.

Dieta:

Puede reanudar la dieta normal

Seguimiento:

La cita postoperatoria de su hijo/a será: _____

Favor de ver a mano izquierda, la lista de números telefónico para las clínicas.

Si su médico ha referido a su hijo/a para un examen Audiológico y todavía no esta programado, llamar al departamento de Audiología al (858) 966-5838 para hacer una cita.