

Uso de medicamentos opioides

Aliviar el dolor de su hijo es importante.

- El tratamiento del dolor es necesario, pero no siempre requiere medicamentos opioides.
- El uso inapropiado de medicamentos para el dolor opioides puede ser peligroso, adictivo o incluso mortal.

Para aliviar el dolor de forma segura:

- Use solo medicamentos para el dolor como lo indique su proveedor. Nunca administre una dosis más alta o con más frecuencia de lo prescrito.
- Use Tylenol o ibuprofeno durante todo el día para controlar el dolor y opioides cuando sea necesario para el dolor intercurrente. La mayoría de los pacientes no requerirán opioides por más de tres días. Disminuya y suspenda el medicamento opioide lo antes posible.
- Revise la etiqueta de su medicamento de prescripción para el dolor (los opioides comunes son la oxycodona y la hidrocodona). Si su prescripción incluye Tylenol (acetaminofén) más opioides, espere 4 horas antes de administrar cualquier dosis adicional de Tylenol simple.
- Use solo medicamentos para el dolor opioides por el tiempo que sea necesario para aliviar el dolor moderado.
- La somnolencia puede ser un efecto secundario de las medicinas de prescripción para el dolor.
Si a su hijo le cuesta mucho despertarse después de una dosis de medicina, llame al 911.
- Los opioides causan estreñimiento. Se recomiendan ablandadores de heces o laxantes al usar estos medicamentos. El farmacéutico puede ayudarlo a elegir si su médico aún no le ha prescrito.

ALERTA DE SEGURIDAD

Demasiado opioide puede hacer que alguien **deje de respirar**

Llame al 911 inmediatamente y administre respiración boca a boca.

Si su médico le prescribió **Narcan o naloxona, administre el medicamento según las indicaciones.**

¡Mantenga su botiquín seguro!

Almacene estos medicamentos en un lugar **CERRADO**.



Deseche los medicamentos que no se usen

Tire los medicamentos en el buzón de su farmacia (busque las Safer Communities [Comunidades más Seguras] de CVS para conocer las ubicaciones).

Para desechar las medicinas en la basura doméstica:

1. MEZCLE las medicinas con sustancias como tierra, arena para gatos o café molido usado.
2. COLOQUE la mezcla en una bolsa de plástico o en un envase sellados.
3. TIRE la bolsa o el envase en su basura doméstica.
4. Borre toda la información personal del envase de la prescripción antes de desecharlo en la basura.